



REVALIDA — Residência Médica

Revalida 2016

Prova comentada

3 questões · gabarito oficial e comentário autoral da equipe OsceLabs em cada questão

discursiva

Conteúdo da prova: documento de acesso público do processo seletivo.

Comentários: produção original OsceLabs.

oscelabs.com.br

QUESTÃO 2

INEP1602 | 002-ProvaDiscursiva-CadQuestões-Tarde REVALIDA 2016 NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA

COMENTÁRIO OSCELABS

O trecho do padrão cobra a dimensão psicossocial do atendimento à mulher vítima de violência sexual. Espera-se que o candidato deixe claro que o cuidado não se esgota na profilaxia medicamentosa: é preciso acolhimento com escuta qualificada, sem julgamento e sem obrigar a mulher a repetir a narrativa do episódio a cada profissional, além de encaminhamento para atendimento psicológico individual. O manejo é intersetorial, multiprofissional e interdisciplinar — saúde, assistência social, segurança e justiça —, cabendo à equipe facilitar o acesso da paciente à rede de apoio e proteção. Pérola de prova: em caso de violência sexual, os itens de acolhimento e de rede valem pontuação tanto quanto a prescrição; quem responde só com fármacos perde toda a dimensão psicossocial.

QUESTÃO 3

REVALIDA 2016 INEP1602 | 002-ProvaDiscursiva-CadQuestões-Tarde NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA
REVALIDA2016 EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS EXPEDIDOS POR
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR ESTRANGEIRAS

COMENTÁRIO OSCELABS

O item cobra a prevenção da gravidez indesejada decorrente da violência sexual. A resposta esperada é a anticoncepção de emergência, indicada a toda mulher em idade fértil exposta a coito vaginal desprotegido e que deve ser ofertada o mais precocemente possível, já que a eficácia cai a cada hora de atraso. O esquema de escolha é o levonorgestrel 1,5 mg via oral em dose única (ou 0,75 mg de 12 em 12 horas), com janela de até cinco dias, mas melhor resultado nas primeiras 72 horas; o esquema de Yuzpe, com anticoncepcional combinado, é a alternativa quando o levonorgestrel não estiver disponível. Pérola: não se exige teste de gravidez prévio nem autorização de terceiros para prescrever, e o método não é abortivo — o erro mais cobrado é justamente postergar a oferta.

QUESTÃO 5

REVALIDA 2016 INEP1602 | 002-ProvaDiscursiva-CadQuestões-Tarde RASCUNHO Os rascunhos não serão considerados na correção. 5 10 15 20 25

COMENTÁRIO OSCELABS

O trecho cobra a profilaxia das IST não virais após violência sexual, feita de forma empírica já no primeiro atendimento, sem aguardar exames. Cobre-se sífilis com penicilina G benzatina 2,4 milhões UI por via intramuscular (1,2 milhão em cada glúteo), gonorreia com ceftriaxona 500 mg IM em dose única e clamídia com azitromicina 1 g VO (dois comprimidos de 500 mg) em dose única. O metronidazol, que cobriria a tricomoníase, deve ser postergado quando se prescreve a anticoncepção de emergência com levonorgestrel, conforme orientação do Ministério da Saúde, para não somar efeitos gastrointestinais que poderiam comprometer o contraceptivo. Havendo alergia comprovada, sobretudo à penicilina, usam-se os esquemas alternativos previstos no protocolo. Pérola: a profilaxia é empírica e em dose única; adiar para aguardar sorologia ou cultura é o erro clássico.